


Ficha Técnica

Flok® 3,15%



A evolução da saúde animal



**Biogénesis
Bagó**

FLOK® 3,15%



DORAMECTINA 3,15 %
ANTIPARASITÁRIO INTERNO E EXTERNO
Solução injetável – Para Bovinos



Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o nº PR 000016-7.000003 em 31/12/2021.

INDICAÇÕES

Antiparasitário interno e externo para bovinos, indicado para o controle e tratamento de parasitos gastrintestinais (*Cooperia punctata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichostrongylus axei* e *Trichuris discolor*), berne (*Dermatobia hominis*), miíase (*Cochliomya hominivorax*) e carrapato (*Rhipicephalus microplus*).

COMPOSIÇÃO

Doramectina 3,15 g
Excipientes q.s.p. 100 mL.

DOSE E VIA DE APLICAÇÃO

1 mL para cada 50 Kg de peso vivo (630 mcg/kg de peso vivo). A tabela a seguir indica a dose por peso corporal.

Peso corpóreo (kg)	Dose (mL)
50	1
51 – 100	2
101 – 150	3
151 – 200	4
201 – 250	5
251 – 300	6

Peso corpóreo (kg)	Dose (mL)
301 – 350	7
351 – 400	8
401 – 450	9
451 – 500	10
501 – 550	11
551 – 600	12

Via de administração: A aplicação deve ser feita por via subcutânea.

CARÊNCIA

BOVINOS: Abate: O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 53 dias após a última aplicação. **Leite:** Não indicado para bovinos em produção de leite para consumo humano.

“A utilização do produto em condições diferentes das indicadas nesta bula pode causar presença de resíduo acima dos limites aprovados, tornando o alimento de origem animal impróprio para o consumo.”



FLOK® 3,15%



DORAMECTINA 3,15 %
ANTIPARASITÁRIO INTERNO E EXTERNO
Solução injetável – Para Bovinos



ADVERTÊNCIAS

Em animais sensibilizados qualquer produto injetável pode produzir, de forma esporádica, reações alérgicas. Frente à manifestação de sintomas como dispneia, tremores, salivação excessiva ou edema, utilizar adrenalina, corticoides e/ou anti-histamínicos, a critério do médico-veterinário.

PRECAUÇÕES

- Respeitar as indicações e a dosagem.
- Utilizar seringas e agulhas estéreis. Não administrar outros produtos na mesma seringa.
- O descarte do produto ou de suas embalagens vazias deve ser feito conforme a legislação ambiental vigente.
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade.
- Obedecer às condições de conservação do produto.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Armazenar o produto em seu envase original.
- Em caso de ingestão ou injeção acidental, procure imediatamente um médico, levando a embalagem do produto.
- O produto não foi testado quanto à segurança em animais abaixo de 8 (oito) meses de idade e fêmeas prenhes/lactantes, portanto, não se recomenda seu uso nessas categorias.

PROIBIDO O USO DESTE PRODUTO EM BOVINOS DE CORTE CRIADOS EM REGIME DE CONFINAMENTOS, SEMI-CONFINAMENTOS E EM REGIME EXTENSIVO NA FASE DE TERMINAÇÃO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (CIT): 0800 722 6001

CONTRAINDICAÇÕES

Quando utilizado nas doses indicadas, não possui contraindicações ou limitações de uso e não é esperada a ocorrência de reações adversas.

CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz solar direta e da umidade. Uma vez aberto, utilizar dentro de um período máximo de 3 meses. Os produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.



FLOK® 3,15%



DORAMECTINA 3,15 %
ANTIPARASITÁRIO INTERNO E EXTERNO
Solução injetável – Para Bovinos



APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 500 mL.

GTIN & NCM

GTIN

7898254643073

NCM

3004.90.59