

# Ficha Técnica

# Forbox® FT



A evolução da saúde animal



# FORBOX® FT



ANTIPARASITÁRIO EXTERNO SOLUÇÃO POUR-ON  
BERNICIDA, CARRAPATICIDA E LARVICIDA

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº SP 000216-0.000004 em 31/07/2024.

## INDICAÇÕES

Antiparasitário externo tópico (*pour-on*) indicado para tratamento de bovinos infestados por Larvas de *Dermatobia hominis* (berne), *Rhipicephalus microplus* (carrapatos) e *Cochliomyia hominivorax* (miíases) com efeito curativo e preventivo.

## COMPOSIÇÃO

Imidacloprid .....	4,0 g
Fluazuron .....	3,0 g
Cipermetrina .....	4,0 g
Excipientes q.s.p. ....	100 mL

## POSOLOGIA

Aplicar 1mL/10kg de peso corporal, por via tópica (*pour-on*).

## VIA DE ADMINSTRAÇÃO

Tópica (*pour-on*).

## MODO DE USO

Aplicar o produto de maneira homogênea pela linha dorsal média do animal, desde a cernelha (região escapular/paleta) até a inserção da cauda. Para aplicação, conforme a apresentação, utilizar a embalagem dosadora do produto, pistola de aplicação ou medidor graduado adequado.

## PERIODO DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE: O abate dos animais tratados com este produto somente deve ser realizado 46 dias após a última aplicação.

LEITE: Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

**“A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.**

# FORBOX® FT



ANTIPARASITÁRIO EXTERNO SOLUÇÃO POUR-ON  
BERNICIDA, CARRAPATICIDA E LARVICIDA



## PRECAUÇÕES

Respeitar as indicações e dosagem. Não utilizar o produto fora do prazo de validade. Obedecer às condições de conservação do produto. Não administrar a animais estressados, febris, ou severamente debilitados. Lavar as mãos após a utilização do produto. Não comer e/ou fumar durante a aplicação. Evitar o contato com os olhos. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não transportar nem armazenar junto a alimentos. Este produto deve ser utilizado sob prescrição e orientação do médico-veterinário. Não aplicar o produto em dias de chuva, pois o produto não foi testado quanto à sua eficácia nessas condições.

## ADVERTÊNCIAS

O produto não foi testado quanto a sua segurança clínica em animais abaixo de 12 (dose) meses de idade e fêmeas prenhes/lactantes, portanto não se recomenda seu uso nessas categorias.

## CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Produto não indicado para uso em fêmeas produtoras de leite destinado ao consumo humano.

## MARGEM DE SEGURANÇA

Estudos demonstram que o produto é seguro quando usado em dose única, conforme indicação, e no triplo e quádruplo da dose indicada.

## REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS

Não são conhecidas reações adversas e efeitos colaterais quando o produto é utilizado conforme indicação de bula.

## INTOXICAÇÕES

Cipermetrina – dados bibliográficos relatam que os sinais observados em casos de intoxicação foram salivação, resposta exagerada a estímulos, ataxia, andar cambaleante, tremores e convulsões. Na dose letal foi observada a degradação axonal e da bainha de mielina. Imidaclopride – dados bibliográficos relatam baixa toxicidade dérmica; Toxicidade moderada quando ingerida em altas doses; Doses muito altas administradas por via oral podem provocar letargia, vômitos, diarreia, salivação, debilidade muscular e ataxia. Os sinais aparecem rapidamente após a exposição e sua duração é limitada. Fluazuron – não há relatos bibliográficos relevantes de toxicidade relacionados a este composto.

# FORBOX® FT



ANTIPARASITÁRIO EXTERNO SOLUÇÃO POUR-ON  
BERNICIDA, CARRAPATICIDA E LARVICIDA



## MEDIDAS EMERGENCIAS DE TRATAMIENTO E CONTROLE

Não há antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.

## INCOMPATIBILIDADE

Não são conhecidas incompatibilidades para o uso do produto.

## CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (CIT):

0800-722-6001

## CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz solar direta, em temperatura entre 15°C e 30°C. Após sua primeira utilização, o produto pode ser armazenado por, no máximo 90 dias, se mantido nas mesmas condições de armazenamento. Os produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto com alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

## APRESENTAÇÕES:

Frascos contendo 1 L e 5 L.

## GTIN & NCM

	Forbox® FT 1L	Forbox® FT 5L
GTIN	7898254643189	7898254643202
NCM	3808.91.99	3808.91.99