


Ficha Técnica

# Galmetrin<sup>®</sup> Solução



A evolução da saúde animal



**Biogénesis  
Bagó**

# GALMETRIN® SOLUÇÃO



## ANTIPARASITÁRIO EXTERNO LARVICIDA E PREVENTIVO

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000216-0.000003 desde 23/07/2024.

## INDICAÇÕES

Antiparasitário externo, indicado para tratamento e prevenção de infestações causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax* em bovinos (miíase ou “bicheira”).

## COMPOSIÇÃO

Imidacloprida ..... 2,0 g  
Cipermetrina ..... 2,0 g  
Excipientes q.s.p. .... 100 mL

## POSOLOGIA E MODO DE USO

Recomenda-se uma limpeza da ferida, prévia à aplicação do produto. Administrar Galmetrin® Solução em quantidade suficiente para cobrir toda a área da ferida, incluindo seu interior, suas bordas e tecidos adjacentes. O tratamento é em dose única, podendo ser repetido a critério do médico-veterinário, conforme avaliação de lesão, por até 3 dias consecutivos.

## PERÍODO DE CARÊNCIA

### BOVINOS:

ABATE: O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 11 dias após a última aplicação.

LEITE: Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

**“A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.**

## CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz solar direta, em temperatura entre 15°C e 30°C.

Após sua primeira utilização, o produto pode ser armazenado por, no máximo 90 dias, se mantido nas mesmas condições de armazenamento. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário. Os produtos veterinários devem ser mantidos fora do alcance de crianças e animais domésticos e não devem ser armazenados junto com alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal.

# GALMETRIN® SOLUÇÃO



ANTIPARASITÁRIO EXTERNO  
LARVICIDA E PREVENTIVO

## PRECAUÇÕES

Respeitar as indicações e dosagem. Não utilizar o produto fora do prazo de validade. Manipular o produto com equipamento de proteção individual, luvas de borracha e máscara. Não comer e/ou fumar durante a aplicação. Lavar bem as mãos após a utilização do produto. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Caso ocorra, lavar os olhos com abundante água, durante 15 minutos e a pele com abundante água e sabão. Caso apresentar irritação local persistente, buscar auxílio médico levando a bula do produto. Em caso de ingestão acidental, buscar auxílio médico imediatamente, levando a bula do produto e não dar de beber substâncias gordurosas, nem leite. Nunca dar de beber a um paciente inconsciente. Pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto devem evitar o contato com o produto. Produto tóxico para abelhas e peixes, evitar contaminar os cursos de água com o produto. Este produto deve ser utilizado sob prescrição e orientação do médico-veterinário. O produto não foi testado quanto à segurança clínica em touros, animais abaixo de 14 (quatorze) meses de idade e fêmeas prenhes, portanto não se recomenda seu uso nessas categorias. Não reutilizar as embalagens vazias. O descarte do produto ou de suas embalagens vazias devem ser realizadas de acordo às legislações ambientais vigentes na região. Em caso de derramamento acidental do produto, absorvê-lo com terra, serragem ou areia, descartando o material de acordo com a legislação ambiental vigente da região.

## CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS (CIT):

0800-722-6001

## APRESENTAÇÃO:

Frascos contendo 250 mL.

## GTIN & NCM

GTIN

7898254643219

NCM

38089199